

## MERKBLATT DRUSE

- Druse ist eine hochansteckende Erkrankung der oberen Atemwege mit Abszessbildung der Lymphknoten durch den Erreger Streptokokkus equi spp. equi. Dieser Erreger ist nur für das Pferd ansteckend.
- Die Ansteckung erfolgt durch eitrigem Abfluss aus Nase oder Lymphknoten direkt von Pferd zu Pferd oder über Stroh, Futter, Putz- und Sattelzeug und Pflegepersonal.
- Erste Krankheitssymptome treten 3-14 Tage nach der Infektion auf und äussern sich durch Fieber, Mattigkeit und Schluckbeschwerden mit Husten.
- Nach Abheilung der Erkrankung ist das betroffene Pferd noch mindestens 1 Monat ansteckend. Es ist auch möglich, dass der Erreger permanent ausgeschieden wird, ohne dass das Pferd Symptome zeigt! **Erst bei 1 negativer Luftsackspülprobe kann ein Pferd als 'drusefrei' beurteilt werden.** Proben aus Nasentupfern oder Nasenspülproben sind nicht zuverlässig, ebenso sind Blutuntersuchungen nur in wenigen ausgewählten Fällen aussagekräftig.

## MASSNAHMEN

- Bei allen Pferden in einem betroffenen Bestand 2x täglich Fieber messen. Frisch erkrankte Pferde haben eine Temperatur von deutlich über 38°. WICHTIG: Ohne Fieber keine Ausscheidung des Erregers!
- Erkrankte Pferde sofort isolieren. Dazu eignet sich beispielsweise eine abseits gelegene Scheune. Jeglicher Pferdeverkehr und die Teilnahme an Turnieren mit Pferden aus betroffenen Betriebszweigen sind zu unterbinden.
- Personenverkehr mit betroffenen Betriebszweigen unterbinden.
- Hygiene: Der Kontakt mit eitrigem Sekret erkrankter Pferde oder die Verschleppung durch Futter, Gegenstände wie Eimer, Schubkarren, Mistgabeln oder Putzzeug sowie durch die Kleidung und Stiefel des Personals ist strikte zu vermeiden.
- Desinfektion: Zuerst Reinigung mit direkter Entsorgung auf einen nicht Pferdebetrieb oder via geschlossenem Abfallsystem (Handschuhe und doppelte Abfallsäcke). Danach Anwendung von Desinfektionsmitteln wie Virkon S oder Betadine (1:200).

Version 15.02.2019